

Požadavek	Druh medu	
	květový	medovicový
Fruktóza + glukóza	min.60,0 %	min.45,0 %
Sacharóza <sup>1)</sup>	nejvýše 5,0 %	
Obsah vody <sup>2)</sup>	nejvýše 20 %	
Kyselost	nejvýše 50 mekv/kg	
HMF	nejvýše 40 mg/kg	
Nerozpustné látky	nejvýše 0,1 %	
Elektrická vodivost <sup>3)</sup>	nejvýše 80 mS/m	nejméně 80 mS/m
Aktivita diastázy <sup>4)</sup>	nejméně 8 stupňů	

### <sup>3)</sup>Výjimky z požadavku elektrické vodivosti


Planika  
(*Arbutus unedo* L.)



Vřesovec  
(*Erica* L.)



Lípa (*Tilia* spp.)



Vřes obecný  
(*Calluna vulgaris* L.)

<sup>2)</sup> Obsah vody nejvýše 23 %



Manuka  
(*Leptospermum*)



Kajeput (*Melaleuca* spp.)




### <sup>1)</sup>Obsah sacharózy nejvýše 10 % u květových jednodruhových medu

Trnovník akát  
(*Robinia pseudoacacia* L.)



Tolice vojtěška  
(*Medicago sativa* L.)



Banksia (*Banksia menziesii* R.Br.)



Kopyšník  
(*Hedysarum* L.)



Blahovičník  
(*Eucalyptus camadulensis*)

<sup>3)</sup> Výjimka z el. vodivosti



*Eucryphia lucida*



*Eucryphia milliganii*



*Citrus* spp.

<sup>4)</sup> Aktivita diastázy nejméně 3° Schadeho



### <sup>1)</sup>Obsah sacharózy nejvýše 15 % u květových jednodruhových medu

Levandule  
(*Lavandula* spp.)



Brutnák lékařský  
(*Borago officinalis* L.)

